

STOFBRUGER FØRSTEHJÆLP



www.antidote.dk

TEGN PÅ OVERDOSIS

Ingen/svag vejrtrækning.
Blå læber og negle.
Ingen reaktion → **RÅB OM HJÆLP!**

SIKRE FRIE LUFTVEJE

Bøj hovedet tilbage og åben munden.
Lyt og føl efter vejrtrækning i max 10 sek.
Se om brystet bevæger sig.

INGEN REAKTION RING 1-1-2

ER DER NORMAL VEJRTRÆKNING?

NEJ → HJERTESTOP! → GÅ TIL ④ + ⑤

JA → GÅ TIL ⑥

KUNSTIGT ÅNDEDRÆT + HJERTEMASSAGE




Hjertemassage = 30 tryk
Indblæsninger = 2 forsøg
Gentag til hjælp kommer/normal vejrtrækning.

MODGIFT NÆSESPRAY HJÆLP HINANDEN!

1 ampul i hvert næsebor - hvis det ikke forsinket
hjertemassage/indblæsninger ved hjertestop.


NORMAL VEJRTRÆKNING

Læg personen på siden.
Sikre frie luftveje ②.
Giv modgift ved tegn på overdosis.
Bliv til ambulancen kommer.



ANTIDOTE-KIT BRUGSVEJLEDNING


1 Monter kanyle på sprøjten




1

3 Sug modgiften ind i sprøjten

2 Fjern top (glas)
Knæk væk fra den blå prik.




2




3

4 Fjern kanylen




4

5 Monter næsespray



5


6 Klar til brug



6

7 Anbring sprøjten i højre næsebor, og sprøjt 1 ml (halvdel) op i næsen.

8 Anbring sprøjten i venstre næsebor, og sprøjt 1 ml (resten) op i næsen.




VIGTIGT!!!

MODGIFTEN BRÆNDER HURTIGT AF → RISIKO FOR NY OVERDOSIS!


Personen skal observeres og tilses af sundhedsfagligt personale!
Bliv hos personen til hjælpen kommer!

ANTIDOTE-KIT INDEHOLDER:

1 stk steril ansigt dække




1 stk næsespray



2 stk glasrør med Naloxone



1 stk kanyle



1 stk plastik sprøjte

