

OPIOIDER

TRAMADOL

HEROIN

MØLLEHJUL

MORFIN

OXYCONTIN

FENTANYL

SPEEDBALL

METADON

DOLOL

KODEIN

DOPE

PAKI

OPIOIDER




Opioider findes i mange former, størrelser og koncentrationer.

Opioider binder sig til receptorerne i centralnervesystemet, hvor de sænker smertesignaler og hæmmer vejrtrækningen.

Derfor anvendes opioider oftest som stærk smertestillende medicin, men kan desuden anvendes som sovemedicin eller til at dæmpe angstsymptomer.

Når en person tager opioider, udvikler kroppen og hjernen en trang til at tage stoffet igen. Man vil desuden over tid udvikle tolerance overfor opioiderne, så der skal større og større dosis til for at opnå en effekt.

Hvis man tager for mange opioider, kan det være livstruende.





FLERE DØR AF OVERDOSER END I TRAFIKKEN



256

Narkorelaterede
dødsfald



163

Trafikdræbte



OPIOIDER PÅ GADEN



Møllehjul eller Doner er stoffet Metadon.

Oxy'er, Morphin, Tradolan, Dololer er alle forskellige typer af Morfin.

En Speedball er en blanding af Heroin og Kokain.

Navne som Dope, Pakistaner, Dondi, Afghaner og Thai refererer alle til stoffet Heroin.

Opioider kommer typisk i et pilleglas eller en foliepakke og ligner derfor ikke noget, man forbinder med hårde stoffer.

Dog er alle opioider receptpligtig medicin og langt stærkere, end de piller man kan få i håndkøb.

Hvis man eksempelvis har købt Tramadol eller Oxycodon online eller i en kiosk, er der desuden tale om stoffer, som kan være fremstillet illegalt, og man kan derfor ikke være sikker på indholdet.

Der er stor forskel på opioidernes styrke -
Fentanyl er eksempelvis cirka 50 gange kraftigere end
Heroin og cirka 100 gange så stærkt som Morfin.
Derfor kan selv en lille dosis være dødbringende.

Eksempler på medicin, der indeholder opioider:

Kodein (Pinex Comp, Kodipar)

Tradolan (Dolol, Nobligan, Tramadol)

Morfin (Contalgin, Doltard, Malfin)

Oxycodon (Oxynorm, Oxicontin, Lindoxa, Reltebon)

Fentanyl (Durogesic/Fentanyl depotplastre)



HVIS DU TAGER OPIOIDER, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ



Overdosering: Hvis du tager for mange opioider på én gang eller bruger opioider sammen med andre stoffer, såsom alkohol eller benzodiazepiner, kan det øge risikoen for overdosering.

Variierende styrke: Opioidernes styrke kan variere fra præparat til præparat, så det kan være farligt at tage for meget på en gang - særligt hvis du ikke kender stoffernes præcise indhold.

Variierende tolerance: Din tolerance dvs. mængden af, hvor meget du kan tåle, kan variere. Tolerancen påvirkes blandt andet af, om det er kort eller længere tid siden, du sidst har taget stoffer og hvilke stoffer, du har taget.

Abstinenssymptomer: Hvis du bliver afhængig af opioider og holder op med at tage dem, kan du opleve abstinenssymptomer såsom kvalme, opkastning, smerter og rysten.


Ofte kan det være nødvendigt at trappe ned i dosis over noget tid.

Straf: Hvis du køber eller sælger opioider, kan du risikere straf, da det er ulovligt at købe og sælge receptpligtig medicin i Danmark.

Infektioner: Hvis du injicerer opioider, er det vigtigt at bruge rene sprøjter og nåle for at mindske stikskader og undgå at sprede infektioner.



TAG ALDRIG STOFFER ALENE

- 
- Vær varsom med mængden af opioider, da styrken og din tolerance kan variere.
 - Del dosen op og vent med at tage flere, til du kan mærke virkningen.
 - Tjek pillerne på [know.drugs.com](https://www.know.drugs.com) eller test dine stoffer via en stoftest, hvis det er en mulighed.
 - Er du alligevel alene, så hold din dør åben og aftal evt. med en ven eller et medlem af familien, at du ringer efter indtag, så nogen kan reagere, hvis du ikke overholder aftalen.

**VI KAN
STOPPE
OVERDOSIS
DØDSFALD**



SÅDAN STOPPER DU EN OVERDOSIS

Antidote er en næsespray, hvor det aktive stof er naloxone, som er modgiften til opioider.

Den virker ved at blokere opioid-receptorerne i hjernen, så opioidernes virkning ophører.

Antidote virker typisk efter 30 sek.- 60 sek.

Antidote fjerner både den smertestillende og sløvende effekt, men også den effekt som dæmper eller helt stopper vejrtrækningen.

Naloxone virker typisk kortere tid end opioiderne.

Derfor skal personen **ALTID** observeres efterfølgende og der skal **ALTID** ringes 1-1-2.

Få et kursus i håndtering af overdosis hos
Antidote Danmark



**BRUG IKKE
STOFFER ALENE
OG ALDRIG UDEN
ANTIDOTE**



STATISTIK AF GØRANSE KUNDMERE

ANTIDOTE

**NÆSESPRAYEN DER
STOPPER OVERDOSER**

ANTIDOTE.DK // 2292 9040




TEGN PÅ OVERDOSIS

Bevidstløs. Ingen/svag vejrtrækning.

Blå læber og negle.

Ingen reaktion → **RÅB OM HJÆLP !**

1



SIKRE FRIE LUFTVEJE

Bøj hovedet tilbage og åben munden.

Lyt og føl efter vejrtrækning i max 10 sek.

Se om brystet bevæger sig.

2



INGEN REAKTION RING 1-1-2

ER DER NORMAL VEJRTRÆKNING?

NEJ → HJERTESTOP! → GÅ TIL ④+⑤

JA → GÅ TIL ⑥

3



HJERTEMASSAGE + KUNSTIGT ÅNDEDRÆT

Hjertemassage = 30 tryk

Indblæsninger = 2 forsøg

Gentag til hjælp kommer/normal vejrtrækning.

4



MODGIFT NÆSESPRAY

HJÆLP HINANDEN!

Pres næsespray i næsebor, hvis det ikke
forsinker hjertemassage/indblæsninger.

5



NORMAL VEJRTRÆKNING


Læg personen på siden.

Sikre frie luftveje ②.

Giv modgift ved tegn på overdosis.

Bliv til ambulancen kommer.

6



**Zine udgivet af
Antidote Danmark**

www.antidote.dk

