

BENZOER

BENNER

STESOLID

VALIUM

TABS

BZD

STESOER

XANAX

ROHYPNOL

KRYDSEER

F2

BENZOER



Benzoer er en forkortelse for Benzodiazepiner, som er nogle piller, der virker sløvende og angstdæmpende på centralnervesystemet.

Benzoer er receptpligtig medicin, der udskrives af læger som sovemiddel og til at dæmpe angst.

Det kan være svært at stoppe med at tage benzoer, hvis man først er blevet afhængig af pillerne.



 HEMOFARM

Diazepam HF 10 mg

diazepam
tableta
HEMOFARM A.D. VRŠAC

 Hemofarm

Diazepam HF 10 mg

diazepam
tableta
HEMOFARM A.D. VRŠAC

 Hemofarm

Diazepam HF 10 mg

 HEMOFARM

Diazepam HF

diazepam
tableta
HEMOFARM A.D.

 Hemofarm

Diazepam HF 10 mg

diazepam
tableta

 Hemofarm

Diazepam HF

FLERE DØR AF OVERDOSER END I TRAFIKKEN




280

Narkorelaterede
dødsfald



154

Trafikdræbte



ILLEGALE BENZOER

Benzoer er receptpligtige piller, men pillerne bliver handlet illegalt eksempelvis mellem venner og bekendte, på sociale medier, i kiosker eller via en dealer.

BENNER - STESOLID
VALIUM - TABS - BZD
KANAX - TRYPSER
F2- STESOER
ROHYPNOL



Flere tager benzoer sammen med andre piller, stoffer eller alkohol, da det kan forstærke effekten og give en anderledes rus.

Benzoers virkningstid kan være mellem to timer til otte dage.

Der er stor forskel i styrken på de forskellige piller, så virkning og varighed af den enkelte pille kan være meget forskellig.

Benzoerne kan også være produceret på det illegale marked, hvor styrke og evt. indhold af andre stoffer er ukendt.

Nogen oplever en modsat virkning af benzoer. I stedet for at virke sløvende bliver nogle hyperaktive, rastløse og aggressive af pillerne, og under påvirkning af benzoerne kan man opleve et 'blackout'.

Dette kaldes paradoks-effekt, og det sker oftest, hvis man indtager store mængder hurtigtvirkende benzoer.

HVIS DU TAGER BENZOER MED ANDRE STOFFER



Benzoer bruges også til at falde ned på efter en aften på opkvikkende stoffer - eksempelvis kokain.

Benzoers virkning forstærkes med andre stoffer og alkohol. Blanding af flere stoffer kan være farligt, da det er svært at forudsige virkningen.

Man kan risikere at få en overdosis, hvilket kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og i værste fald ende i dødsfald.



BIVIRKNINGER

De fleste bivirkninger ved benzoer opstår, hvis man tager pillerne over længere tid.

Langtidsbrug af benzoer er årsag til flere bivirkninger såsom dårlig hukommelse, sløvhed, depression, øget angstniveau og afhængighed.

Alle benzoer kan forårsage disse bivirkninger, uanset om de tages som sovepiller eller som angstdæmpende medicin.



ABSTINENSER

Hvis man tager benzoer i mere end nogle få uger vil de fleste opleve at få abstinenser, når de stopper med at tage dem.

Abstinenserne kan vise sig i form af uro eller angst og søvnløshed.

Har du taget benzoer dagligt over længere tid kan du opleve meget kraftige abstinenser, som i værste tilfælde kan være livsfarlige.

Abstinenserne kan vare flere måneder til år alt efter hvor lang tid, man har taget pillerne.

**Kontakt altid en læge
for hjælp til udtrækning.**



HVIS MAN TAGER FOR MEGET

Symptomer på forgiftning kan svinge meget fra overdreven træthed, svimmelhed, utydelig tale, hovedpine, kvalme, bryst smerter til opstemthed, ophidselse eller nervøsitet.

Ved særligt store doser - og ofte sammen med indtag af andre stoffer - kan man miste bevidstheden og gå i koma.



HVAD SKAL DU GØRE, HVIS DU MISTÆNKER EN FORGIFTNING?

**Ring altid 1-1-2 for akut hjælp,
hvis personen har unormal eller ingen
vejrtrækning.**

**Giv hjertemassage og kunstigt åndedræt
indtil ambulancen kommer.**

Giv evt. Antidote næsespray.

**OBS: Antidote næsespray virker IKKE
mod benzoer, men giv den alligevel,
da illegale benzoer evt. kan indeholde
opioider eller personen på anden vis
har opioider i blodet.**

PAS PÅ DIG SELV OG PÅ HINANDEN

- Pas på med mængden, da styrken af stoffet og hvad du kan tåle, kan variere.
- Del dosen op og vent med at tage flere, til du kan mærke virkningen.
- Tjek pillerne på pro.medicin.dk eller appen KnowDrugs.
- Er du alene om dit forbrug, så tal med nogen om det - også selvom det kan være svært.
- Tag så vidt muligt ikke piller og stoffer alene og lad ikke personer, der er påvirkede være alene.



Zine udgivet af Antidote Danmark

Læs mere om piller på
www.antidote.dk/piller

